



DOSIS ADICIONALES PARA PERSONAS CON EL SISTEMA INMUNE DEBILITADO (inmunocomprometidos)

Las personas con el sistema inmune comprometido tienen más probabilidades de contagiarse con COVID-19 que las personas con el sistema inmune normal. Y si se infectan, es más probable que se enfermen gravemente o que propaguen el virus a otras personas en su casa.

Estudios han mostrado que algunas personas que tiene el sistema inmune comprometido no generan suficiente protección tras recibir 2 dosis de la vacuna Pfizer o Moderna.

Debido a esto, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que las personas con el sistema inmune gravemente débil reciban una dosis adicional. Esto incluye personas que han:



- Estado recibiendo tratamiento contra el cáncer, tumores y cáncer en la sangre
- Recibido un trasplante de órgano o están tomando medicamentos que debilitan el sistema inmune
- Recibido un trasplante de células madre en los últimos 2 años o están tomando medicamentos que debilitan el sistema inmune
- Sufrido o padecen de inmunodeficiencia primaria moderada o grave (como el síndrome de DiGeorge o el síndrome de Wiskott-Aldrich)
- Sufrido del virus VIH en estado avanzado o sin tratar
- Estado recibiendo tratamiento con alta dosis de corticoesteroides u otros medicamentos que pueden debilitar la respuesta del sistema inmune

Hable con su médico a cerca de recibir la dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19. Si necesita una 3ra dosis, consulte sobre el mejor momento para recibirla con base en su plan actual de tratamiento. Esto es particularmente importante si está a punto de comenzar o retomar tratamiento inmunosupresor.

Usted también debe saber:



- La 3ra dosis de la vacuna ARNm (Pfizer y Moderna) debe administrarse al menos 28 días después de 2da dosis.
- El mismo tipo de vacuna debe administrarse si es posible. Por ejemplo, si usted recibió Pfizer, trate también de recibir Pfizer para su 3ra dosis.
- Una dosis de refuerzo actualmente no ha sido recomendada para aquellos que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) evalúa los datos de efectividad de esta vacuna en individuos inmunocomprometidos.

Las vacunas de refuerzo no han sido recomendadas hasta ahora. La FDA está conduciendo una evaluación independiente de los datos y el condado de Los Ángeles está preparado para poner en marcha las recomendaciones de la FDA con respecto a la vacuna de refuerzo una vez se complete la evaluación este otoño.